



МИКРОСПОРИЯ или СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ

(памятка для населения)



Составитель: Хамматова А.А. - врач-
дерматовенеролог ГАУЗ РКВД №1.



ГБУЗ РЦМП, з. 1, т. 3000 экз., 2018 г.

УФА 2017

Микроспория – что это такое?

Микроспория – грибковое заболевание, при котором поражаются кожа и волосы. Заболевание известно также как “стригущий лишай”, что обусловлено особенностями его проявления.

Микроспория является самой распространённой грибковой инфекцией, обладает высокой заразностью, чаще страдают дети, что обусловлено свойствами кожи ребёнка.

Основной источник заболевания – кошки (обычно котята). Заражение микроспорией происходит при непосредственном контакте с больным животным или предметами, инфицированными шерстью или чешуйками.




Как проявляется микроспория?

Проявления микроспории у животных характеризуются участками облысения на мордочке, ушных раковинах, а также на передних, реже задних, лапах.

Зачастую внешне здоровые кошки могут быть носителями грибка!

Людей выделяют микроспорию гладкой кожи и волосистой части головы. На гладкой коже появляется возвышающееся над кожей пятно с чёткими границами и бледно-розовой шелушащейся центральной частью – очаги имеют вид колец.



На волосистой части головы обычно присутствуют 1–2 крупных очага величиной до 5 см с округлыми четкими границами. Волосы здесь обламываются, оставшиеся пеньки выглядят как бы подстриженными (отсюда название “стригущий лишай”), они тусклые, покрыты чехлом серовато-белого цвета.

Чем опасна микроспория?

Важным фактором, который способствует распространению инфекции, является высокая устойчивость грибов во внешней среде.

Эти грибы способны сохранять свои инфицирующие и патогенные свойства в течение многих месяцев.

При несвоевременном или нерациональном лечении возможно распространение очагов микроспории на значительные участки кожи, переход в осложнённые формы, что впоследствии может привести к стойкому облысению этих участков.

Лечение этого заболевания длительное, при поражении волосистой части головы может занять более месяца.

При этом дети не допускаются в школы и детские сады.

При поражении волос лечение проводится преимущественно в стационаре, необходимо назначение противогрибковых таблеток, сбривание волос на голове.

После перенесённой микроспории возможно повторное заражение — стойкого иммунитета при этом заболевании нет.

Профилактика микроспории

✚ Своевременное выявление, изоляция и лечение больных микроспорией.

✚ В детских учреждениях следует проводить периодические медицинские осмотры.

✚ Вещи, принадлежащие больному микроспорией, подлежат дезинфекции.

✚ Больные микроспорией животные либо устраниаются, либо им проводится полноценное противогрибковое лечение у ветеринара.

✚ Дети должны иметь индивидуальные постельные принадлежности, нательное бельё, шапочки, полотенца, расчёски, заколки, бантики и т.д.

✚ Нельзя разрешать пускать животных в постель, греть их под рубашкой. После игры с ними следует сразу же вымыть руки тёплой водой с мылом.

✚ Машинки для стрижки, ножницы, расчёски в парикмахерских необходимо дезинфицировать после каждого клиента.

