


Башкортостан Республикаһы Һаулыҡ һаҡлау министрлығы
Башкортостан Республикаһы Һаулыҡ һаҡлауҙы иҫкәртеү
(профилактик) үзәге

Кысынманы иҫкәртеү (профилактикалау) тураһында

(халыҡ өсөн иҫкәртмә)



Өфө 2014

Сир Кысынма (scabies) – ул кысынма талпаны паразиты кузгаткан
йогошло сир.

Төнгө кысытыу, тән тиреһендә тура йә иһә бормалы кысынма
юлдарының барлыкка килеүе – был сир үзенсәлектәре һанына инә.

Ябай күзгә был талпан күренмәй,
сөнки ул 0,25-0,35 мм. зурлығында.
Кысынма талпаны кешелә үсешә һәм
кыска вакыт дауамында ул мендәрзә,
кейемдә, ишек тоткаһында, урын-ер
каралдыһында була ала.



Кайһы бер ата-әсәләр кысынманы йорт хайуандарынан (эт,
алйырзан) йокторорға мөмкин тигән фекерзә. Ләкин был фекер
ысынбарлыкка тап килмәй.

Күбегенсә кысынма сире ауырыу кеше менән аралашканда йога -
был сирзе йоктороузың тура юлы. Шулай ук, сирле кеше менән
аралашмайынса, көнкүреш әйберзәре һәм урын-ер каралдылары аша
был сир йогорға мөмкин. Был инде сирзе йоктороузың тура булмаған
юлы.

Ғаиләлә бер сирленән кысынманы башка туғандар (өлкәндәр һәм
балалар) йокторған осракта тоттош кысынма үзәге барлыкка килеүе
мөмкин. Бала ни тиклем йәшерәк - шул тиклем был сирзе йоктороу
мөмкинлегә юғарырак. Төрлө коллективта: мәктәпкәсә йәштәге
балалар ойошмаһында, мәктәптә был сирзең кузғалыуы мөмкин.
Үзәктән тыш кысынманы йоктороу осрактары (мунсала, поездда,
кунакханала) – бик һирәк күренеш.



Ләкин кысынма талпаны көн күреш эйберзәре һәм урын-ер каралдылары менән бер-бер артлы бәйләнештә булган кеше ағымы аша күсә ала.

Ауырыу билдэләре

Кысынма талпандары кеше тиреһен шунда ук кимереп, интенсив туклана башлай. Инә талпандар шул вакытта ук йомортка һала. Инә талпан 1,5 ай йәшәй һәм ошо осорза ул 40-50 йомортка һала. Бер нисә көндән был йоморткаларзан карышлауыктар барлыкка килә. Улар тире өстөнә сығып, өлкән талпандарға әйләнә. Тире катламының икенсе урындарына күсеү менән яңы цикл башлана.

Күбегенсә, сир йоккандан алып 2 азнанан һуң беленә. Ин беренсе һәм төп билгеһе ул – бөтөн тән тиреһе кысытыуы. Төнөн кысытыу көсәйә, сөнки был осорза инә талпан активлаша. Балалар йоклағанда тиреһен тырнайзар, шул урынға инфекция элгеп, эренләргә мөмкин. Балалар төнөн насар йоклай, иртән төшөнкө кәйефтә, мыжып уяна. Әммә был вакытта кысыу әзәйә. Кайһы берзә кысытыу көсчөз була, балалар зарланмай һәм ата-әсәләр сирле баланы күрмәй.

Кысынма, күбегенсә, тиренең йока йомшак урындарында тарала: бармак араларында, кул суғында, шулай ук эстә, аркала, ултырышта, янбаштың эске яғында; кайһы вакыт енес ағзаһы һәм қаҫа сабыртма менән каплана. Балаларза сабыртма аяк табанында, култык астында, ултырышта таралырға мөмкин.

Ошоға окшаш билдэләр булһа, шунда ук табипка, ин беренсе дерматологка, мөрәжәғәт итергә кәрәк.

Тезөүсөһе: Башкортостан Республикаһы һаулыҡ һаклауҙы иҫкәртеү (профилактик) үзәге, Ойштороу-методика булеге

БР ҺҺМ БМПУ, 2014 й.

